

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2017 w województwie kujawsko-pomorskim

Lp.	Gatunek/ odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ	Lp.	Gatunek/ odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Jęczmień jary				Pszenżyto jare			
1	Basic	2011	2013	1	Dublet	2006	2007
2	Ella	2012	2014	2	Mazur	2014	2015
3	KWS Atrika	2013	2015	3	Sopot	2015	2017
4	KWS Olof	2010	2011	Pszenżyto ozime zimotrwałość (skala 9°)*			
5	Penguin	2013	2015	1	Meloman 5.5°	2015	2016
6	Soldo	2013	2014	2	Panteon ^R 6.0°	2016	2017
7	Paustian ^R	2016	2017	3	Pizarro 5.0°	2009	2011
Jęczmień ozimy zimotrwałość (skala 9°)*				4	Rotondo 5.5°	2015	2017
1	Antonella 5.0°	2012	2014	5	Tomko 6.0°	2013	2014
2	KWS Meridian 5.0°	2012	2015	6	Trapero ^R 6.0°	2016	2017
3	SU Melania 4.5°	2014	2016	Żyto ozime			
4	Titus 5.0°	2013	2014	1	Horyzo	2012	2014
5	Zenek 5.5°	2014	2016	2	Stanko	2011	2012
Owies zwyczajny jary				3	Poznańskie ^R	2016	2017
1	Bingo	2009	2010	4	KWS Livado F ₁ ^R	2016	2017
2	Komfort	2013	2016	5	SU Performer F ₁	2015	2016
3	Nawigator	2015	2017	6	SU Stakkato F ₁	2013	2014
Owies nagi jary				7	Tur F ₁	2014	2016
1	Nagus	2011	2013	Rzepak jary			
Pszenica zwyczajna jara				1	Lennon	2013	2016
1	Arabella (A)	2011	2013	2	Delight F ₁	2010	2015
2	Harenda (B)	2014	2015	3	Kaliber F ₁	2009	2016
3	Goplana (A)	2015	2017	4	Legolas F ₁	2014	2016
4	KWS Torridon (A)	2012	2013	5	Lumen F ₁ ^R	2016	2017
5	Tybalt (A)	2005	2007	Rzepak ozimy			
Pszenica zwyczajna ozima zimotrwałość (skala 9°)*				1	ES Valegro	2015	2016
1	Arkadia (A) 6.0°	2012	2013	2	Lohana	2013	2016
2	Artist (B) 4.0°	2014	2016	3	Sherlock	2011	2014
3	Belissa (B) 5.0°	2015	2017	4	Alexander F ₁ ^R	2016	2017
4	Delawar (A) ^R 4.0°	2016	2017	5	Alvaro KWS F ₁ ^R	2016	2017
5	Fakir (B) 4.5°	2014	2015	6	Atora F ₁ ^R	2016	2017
6	Hondia (A) 5.5°	2015	2017	7	Bonanza F ₁	2013	2017
7	Julius (A) 5.0°	2012	2014	8	Garou F ₁	2014	2017
8	KWS Ozon (B) 4.0°	2011	2014	9	Kuga F ₁ ^R	2016	2017
9	Linus (A) 4.0°	2012	2015	10	Marcopolos F ₁	2013	2016
10	Praktik (A) 4.0°	2013	2015	11	Mercedes F ₁	2014	2017
11	RGT Kilimanjaro (A) 4.0°	2015	2017	12	Popular F ₁	2015	2017
12	Rotax (B) 5.0°	2015	2017	13	Visby F ₁	2009	2010
13	Sailor (A) 4.5°	2012	2013				

Lp.	Gatunek/ odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe			
1	Akord	2012	2013
2	Batuta	2012	2014
3	Tarchalska	2004	2008
Groch siewny odmiany pastewne			
1	Hubal	2005	2008
2	Turnia	2011	2013
Łubin wąskolistny			
1	Kalif	2006	2010
2	Regent	2009	2015
3	Rumba	2015	2017
4	Tango	2012	2014
5	Wars	2014	2015
Łubin żółty			
1	Baryt	2011	2013
2	Bursztyn	2014	2016
3	Lord	2006	2017

Lp.	Gatunek/ odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Ziemniak odmiany jadalne			
bardzo wczesne			
1	Arielle	2014	2016
2	Denar	2001	2008
3	Lord	2001	2008
wczesne			
1	Gwiazda	2012	2014
2	Ignacy	2014	2016
3	Michalina	2010	2012
4	Vineta	2001	2012
średniowczesne			
1	Finezja	2009	2011
2	Satina	2001	2013
3	Tajfun	2004	2008

Objaśnienia:

A – odmiany jakościowe, B – odmiany chlebowe

F₁ – mieszańce

R⁻ - odmiana wstępnie rekomendowana

*-zimotrwałość: 9- bardzo duża, 5- średnia, 1- bardzo mała (wg COBORU)

Ostatnie zmiany w LOZ nastąpiły 26 stycznia 2017 decyzją dyrektora Stacji Koordynującej PDO w woj. kujawsko – pomorskim, po zapoznaniu się z opinią Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO